Main vasculaire artérielle du volleyeur

Y Rolland, P Jego, V Daniel, E Verdonck, P Rochcongar, Rennes

M Giaoui, R Goux, JF Toussaint, Paris

Plan

Introduction

Diagnostics et traitement

Prévention et dépistage

Ischémie artérielle distale du volleyeur

Lésions vasculaires moins fréquentes / lésions ostéoarticulaires

Topographie

proximale: défilé thoraco-brachial
distale: marteau hypothénar

0363-5465/90/1805-0520\$02.00/0
THE AMERICAN JOURNAL OF SPORTS MEDICINE, Vol. 18, No. 5
© 1990 American Orthopaedic Society for Sports Medicine

Arterial abnormalities of the hand in athletes*

GORDON W. NUBER,†‡ MD, WALTER J. McCARTHY,§ MD, JAMES S. T. YAO,§ MD,
MICHAEL F. SCHAFER,† MD, AND JACOB R. SUKER,|| MD

Syndrome de la traversée thoraco-brachiale

3 types: interscalénique, costo-claviculaire, sous-pectoral.

Anomalies congénitales / acquises.

Symptomatologies artérielle, veineuse, neurologique souvent intriquées

Clinique: ischémie intermittente positionnelle

Examen diagnostique: écho-doppler.

Syndrome de Raynaud

Acrosyndrome vasculaire paroxystique

Forme primitive (maladie de Raynaud), secondaire (sclérodermie+++)

Critères d'Allen et Brown (forme primitive)

Bilan complémentaire: Biologique (anticorps antinucléaires)
Capillaroscopie.
Pléthysmographie.
Laser doppler.
Echo-doppler

Ischémie artérielle distale du volleyeur

Lésions vasculaires aiguës rares (Polhmann 2002)

Lésions chroniques: répétition de microtraumatismes locaux

COPYRIGHT © 2005 BY THE JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY, INCORPORATED

VASCULAR CHANGES OF THE HAND IN PROFESSIONAL BASEBALL PLAYERS WITH EMPHASIS ON DIGITAL ISCHEMIA IN CATCHERS

BY T. ADAM GINN, MD, ADAM M. SMITH, MD, JON R. SNYDER, BS, MS IV,
L. ANDREW KOMAN, MD, BETH P. SMITH, PHD, AND JULIA RUSHING, MSTAT

Lésions vasculaires: mécanisme

Lésions intima: thrombose

Lésions média: anévrisme (Ho 1985)

Répétition de microtraumatismes locaux → vasospasme
par réponses myogène et neurogène (Whelan 1967)

Phénomène réversible (Conn 1970)

Rappels d'anatomie

- 1) Artère radiale
- 2) Artère ulnaire
- 3) Arcade palmaire profonde
- 4) Arcade palmaire superficielle
- 5) Artère digitale commune palmaire
- 6) Artère digitale latérale du IV
- 7) Artère digitale médiale du III
- 8) Artère pulpaire

Plan

Introduction

Diagnostics et traitement

Prévention et dépistage

Ischémie artérielle distale du volleyeur

Mythe ou réalité ?

Présentation complexe, sous estimation ?

Ischémie clinique : Enquête Marc Quéméner

Année	Poste	Tabac	Durée	Traitement	Evolution
1992	GD		6 mois	chirurgie	strap
1998	SL		2 ans	chirurgie	gant
2001	FP		1 an	médical	tr. sensibilité
2003	KK	+	6 mois	médical	gant, rejoue
2004	EN			chirurgie	douleurs
2006	SR		1 an	médical	arrêt
2007	GB		1 an	médical	rejoue
2007	YL	+	1 an	médical	arrêt
2008	HK	+	6 mois	médical	rejoue
2009	KL	+	3 mois	médical	gant
2010	TA		12 mois	chirurgie	?
2010	CS	+	2 mois	médical	rejoue
2011	PP	+	6 mois	médical	rejoue
2011	TB		4 mois	médical	attente
2011	MA	+	2 mois	médical	??

Cas princeps: 2003

KK, Volleyeur professionnel, 23 ans

ATCD personnels: fracture du coude G,
Tabac.

Cyanose pulpaire à l'effort

Nécrose sous-unguéale de l'index droit

TTB négative, test d'Allen normal.

Retard de recoloration pulpaire D

Cas princeps

Biologie normale

ECG et écho-cœur normaux.

Echo-doppler:

préthrombose de l'artère ulnaire,
aspect grêle de l'artère radiale droite
thrombose de l'arcade superficielle,
hypo-perfusion des doigts.

Angio IRM de la main droite

Thrombose de l'artère ulnaire et de l'arcade superficielle.
Perméabilité de l'artère radiale, volumineuse branche collatérale dorsale (flèches).

Cas clinique: KH

25 ans, attaquant, droitier, fumeur

Episodes d'engourdissements de la main droite en matches

Aggravation progressive:

 cyanose douloureuse de ma main droite en matches

 cyanose permanente

Pas de pouls radial ou ulnaire

Pas de syndrome du défilé thoraco brachial

Echo Doppler initial

Mode B coupe transverse: thrombose semi récente de l'artère ulnaire

Echo Doppler initial

Thrombose récente de l'artère radiale

Evolution clinique

Traitement anticoagulant à dose curative pendant 1 mois

Relais par antiagrégants pendant 2 mois

Amélioration clinique

Maintien au repos pour 3 mois supplémentaires

Reprise progressive du jeu

Echo Doppler de contrôle (3 mois)

Codage couleur: reperméabilisation des artères au poignet

III droit, artères digitales

Initial: pas de flux repérable au niveau des artères médiales et latérales

Contrôle à 3 mois, artères digitales : 0,6 mm

III droit, artères digitales

Contrôle à 6 mois, artères digitales : 0,9 mm

IV droit, artères digitales

Contrôle à 6 mois, thrombose distale sur la médiale

III gauche, artères digitales

Initiale: 0,8 mm

6 mois: 1,1 mm

Cas clinique: KLR

20 ans, droitier, attaquant, Intoxication tabagique

Episodes d'engourdissements de la main droite en matches

Aggravation progressive: main droite ischémique en permanence (bord ulnaire)

Pas de pouls ulnaire

Pas de syndrome du défilé thoraco-brachial

Artère ulnaire droite

Stade initial: thrombose complète

A un mois: reperméabilisation partielle

III^e doigt, artères digitales médiales

Stade initial

Droit: 4 mm

Gauche: 10 mm

A un mois

Droit: 9 mm

Gauche: 14 mm

Ve droit

Thrombose de la distalité de l'artère digitale latérale

Cas clinique CS

21 ans, attaquant, droitier, pas de tabac,

Ischémie: majeur, index et annulaire main droite en 2010

Doppler initial: thrombose ulnaire
 ischémie digitale (II, III)
 thrombose IV

Ischémie chronique des doigts de la main droite

Etude en Doppler couleur des artères au poignet

Perméabilité de l'artère radiale

Thrombose de l'artère ulnaire

Etude en Doppler couleur des artères digitales

IV de la main droite:

Thrombose de l'artère digitale médiale

IV de la main gauche:

Perméabilité de l'artère digitale médiale

Cas clinique: PP

28 ans, passeur, droitier, tabac,

Ischémie: majeur, index et annulaire main droite en 2010

Ulcération du III droit

Echo Doppler initial

Droite: Thrombose de l'artère ulnaire distale

Echo Doppler initial

Thrombose de l'artère
digitale commune droite

Echo Doppler initial

Artère digitale latérale

Artère digitale médiale

Droite: Hypoperfusion du III

Echo Doppler de contrôle (2 mois)

Artère ulnaire droite

distale

Cas clinique: BT

23 ans, pointu, droitier,

Pas de tabac

Ischémie: majeur, index et annulaire main droite en 2010

Echo Doppler initial

Droite: Thrombose de l'artère radiale distale

Droite: Thrombose de l'artère ulnaire distale

Echo Doppler initial

Artère digitale latérale

Artère digitale médiale

Droite: Hypoperfusion modérée du III

Angiographie

Droite: Thrombose de l'artère radiale et de l'ulnaire distale

0

0600

Clinique Rhone D
Allu
Allura Xpe

0
1527410

1527410

1024 x 1024
1791 x 1032

l'image : 1024 x 1024
la vue : 1791 x 1032
LF : 344
x Y : 388 px Valeur : 676,00

1024 x 1024

file : 90

86% Angle : 90
00

Echo Doppler de contrôle (2 mois)

Artère radiale droite

Artère ulnaire droite

Cas clinique MA

20 ans, Pointu, droitier, tabac,

Ischémie: majeur, index et annulaire main droite en 2011

Echo Doppler initial

Gauche: Perméabilité de l'arcade superficielle

Droite: Thrombose de l'arcade superficielle

Angio IRM: main droite

Perméabilité de l'arcade profonde

Thrombose de l'arcade superficielle

Angio IRM: main droite

Perméabilité de l'arcade profonde

Thrombose de l'arcade superficielle

Artères digitales du III

Artère digitale latérale : 0,7 mm

Artère digitale latérale : 1,3 mm

Artère digitale médiale : 0,9 mm

Artère digitale médiale : 1,1 mm

Droite

Gauche

**BLUNT INJURY OF THE RADIAL AND ULNAR ARTERIES IN VOLLEY BALL PLAYERS.
A REPORT OF THREE CASES OF THE ANTEBRACHIAL-PALMAR HAMMER SYNDROME**

S. KOSTIANEN, MD* and S. ORAVA, MD†

Brit. J. Sports Med. – Vol. 17, No. 3, September 1983, pp. 172-176

Three volleybal players cases of palmar hammer syndrome

Decreased blood perfusion of their right hand and fingers

Due to repeated ball and floor impacts during training and playing

Radial and ulnar arteries lesions were reversible

Patients recovered spontaneously during the rest from excessive physical activity by their hands

The vascular lesions of this kind are rare but seem to be typical to volleyball players

Upper Extremity Arterial Injuries in Athletes

By Mark R. Jackson

Upper extremity arterial injury resulting in hand and digit ischemia can occur in athletes who perform repetitive, high-stress, overhead arm motions. The initial presentation of these injuries often mimics

LA MAIN DES PELOTARIS A MAIN NUE

G. LAPORTE

L'artériopathie digitale traumatique du pelotari à main nue
145 observations

*Travail de la Commission Médicale de la
Fédération Française de Pelote Basque
Dr Guy LAPORTE Médecin Fédéral National
M. J.B. DUNAT, Kinésithérapeute
M. J. ESPAGNACQ, Docteur*

*avec la collaboration de
Dr M.F. BUSQUET, Angéiologue
Dr Ph. GUIGNAL, Angéiologue
Dr DOUWS, Radiologue
et avec l'aide technique
de la maison DIATECNIC*

Plan

Introduction

Diagnostics et traitement

Prévention et dépistage

Prévention et dépistage

Anatomie

Traumatismes répétés

Toxiques

Variantes anatomiques

Disposition des vaisseaux

Variantes anatomiques

Calibre des artères digitales

		PR	Sclérodermie
25°C			
Digitale	latérale	1 +/- 0.2 mm	0.5 +/- 0.4 mm
	médiale	1 +/- 0.2 mm	0.6 +/- 0.3 mm
11°C			
Digitale	latérale	0.6 +/- 0.2 mm	0.2 +/- 0.3 mm
	médiale	0.7 +/- 0.2 mm	0.4 +/- 0.3 mm

Prévention et dépistage

Anatomie

Traumatismes répétés

Toxiques

Compression de l'artère ulnaire

Compression de l'artère ulnaire

Acquisition Doppler couleur

Disparition du signal Doppler : 8 Newtons

Impact de ballons : plusieurs centaines de Newtons

Smashing the volley ball with a proximal palm.

Volley ball serve with a palm.

Blocking the ball over the net.

6: Volley ball player receives the serve with his forearm. Fig. 6 shows the position of the hand and forearm. The ball is received on the anterior and radial sides of the forearms.

Fig. 7: A rescue jump in order to lift the ball near the floor ("tiger jump"). (A) The position of the hand before hitting the ball is shown in B and the impact against the floor after that in C.

Vasospasme et thrombose artérielle

Importance des traumatismes répétés

Prévention et dépistage

Anatomie

Traumatismes répétés

Toxiques

Vasospasme et thrombose artérielle

Importance des toxiques

4 Hommes jeunes,
Intoxication régulière au cannabis
Artériopathie distale
des membres inférieurs (3/4),
du membre supérieur (1/4)
Phénomène de Raynaud 3/4
Pouls distaux abolis
troubles trophiques constants

Artériopathies du cannabis : quatre nouveaux cas

Cannabis arteritis: four new cases

C. Cazalets ^{a,*}, E. Laurat ^a, B. Cador ^a, F. Jan ^b, Y. Rolland ^c, P. Jégo ^a, B. Grosbois ^a

Patient 4

Homme

30 ans

Nécrose pulpaire 3^e doigt gauche
phénomène Raynaud depuis 5
mois aux 2 mains et 2 pieds
pouls pédieux droit aboli

15 PA

5 joints/j (12 ans)

Écho-doppler : atteinte distale
bilatérale aux MS des arcades
palmaires et des collatérales des
doigts ; TA droite grêle

Iloprost en 09/01 et sevrage :
évolution favorable

Prévention et dépistage

Etudes chez les jeunes joueurs et les professionnels

Exploration

Clinique

Echo-Doppler

Clubs

Professionnels:

Rennes
Asnières
Paris
Tourcoing
Cannes
Poitiers
Equipe de Tunisie

National amateur (Rennes)

CNVB Montpellier

CREPS (Dinard, Chatenay Malabry)

Footballeurs (Stade Rennais)

Cohorte

9 « anciens »

42 professionnels

30 pré-professionnels CNVB

12 national amateur (Rennes)

38 jeunes CREPS

10 footballeurs

141 sujets

Résultats

Pas d'anomalie: artères du poignet (radiale, ulnaire)
arcades palmaires,

Difficultés à analyser les variantes anatomique

Aspect grêle des artères digitales

Pro A

main dominante

attaquants

Artères radiales et ulnaires

Artères digitales

CREPS

Pro

Artères digitales

Conclusion

Joueurs doivent limiter les facteurs de risque
(tabac, ...)

Cas d'ischémie pourraient se multiplier car
pratique commence plus tôt et est intense
(cas d'un joueur du CREPS devant jouer avec un gant)

Conclusion

Ischémie aigue d'origine artérielle n'est pas synonyme de fin de carrière

Détection précoce permet une prise en charge efficace et reprise du jeu rapide

Message à retenir

Y penser

Dédramatiser

Nous contacter

Réchauffer la main